

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 20.06.2025 07:55:10
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

«Вероятность и статистика»

Квалификация выпускника	бакалавр
Направление подготовки	09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Направленность (профиль)	«Безопасность информационных систем и технологий»
Форма обучения	очная
Кафедра- разработчик	Прикладной математики
Выпускающая кафедра	Кафедра информатики и вычислительной техники

Типовые задания для контрольной работы

№ 1. Имеются две урны с шарами. В первой урне 5 шаров, из которых 2-белых шара и 3-черных. Во второй урне 6 шаров, из которых 3-белых шара, а 3- черных. Из первой урны случайным образом вытаскивается один шар и перекладывается во вторую урну (этот шар в дальнейшем мы будем называть «переложённым»). После этого шары во второй урне перемешивают, и из них случайным образом выбирается один шар и выбрасывается (этот шар в дальнейшем мы будем называть «выброшенным»).

1. Какова вероятность, что «выброшенный» шар - черный, если известно, что «переложённый» шар – белый?
2. Какова вероятность, что «выброшенный» шар - черный, если неизвестен цвет «переложённого» шара?
3. Какова вероятность, что «переложённый» шар - белый, если известно, что «выброшенный» шар – черный?
4. Какова вероятность, что «выброшенный» и «переложённый» шары разного цвета, если неизвестны цвета обоих шаров?
5. Какова вероятность, что «переложённый» шар - белый, если известно, что он разного цвета с «выброшенным» шаром?
6. После всего этого из первой урны было вынуто 5 шаров, причем шары вынимались по одному и с возвращением. Какова вероятность, что среди этих вынутых шаров оказалось ровно 2 белых, если известно, что «переложённый» шар – белый?

№ 2. Имеется выборка некоторого объема, которая состоит из независимых одинаков распределенных случайных величин, имеющих нормальное распределение с неизвестным средним и неизвестной дисперсией:

0.44; 0.51; 0.38; 0.58; 0.52; 0.48; 0.27; 0.47; 0.54; 0.31; 0.36.

№ 1. Написать эмпирическую функцию распределения.

№ 2. Построить гистограмму с шагом 0.1.

№ 3. Оценить MX , DX , $\rho = P(X < 0.5)$.

№ 4. Найти доверительный интервал для MX с $\alpha = 0.95$, DX с $\alpha = 0.9$, P с $\alpha = 0.99$.

№ 5. Проверить

а) $H_0 = \{MX = 0.5\}$ с $H_1 = \{MX \neq 0.5\}$ $\alpha = 0.01$.

б) $H_0 = \{DX = 0.01\}$ с $H_1 = \{DX \neq 0.01\}$ $\alpha = 0.05$.

в) $H_0 = \{P = 0.05\}$ с $H_1 = \{P \neq 0.05\}$ $\alpha = 0.05$.

Типовые вопросы и практические задания к экзамену

Задание для показателя оценивания дескриптора «Знает»	Вид задания
<p><i>Сформулируйте развернутые ответы на следующие теоретические вопросы (сформулировать основные определения, теоремы, свойства; привести доказательства основных теорем, продемонстрировать примеры, при необходимости проиллюстрировать ответ графиками, рисунками):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Элементы комбинаторики. 2. Случайные события. 3. Классическое определение вероятности. 4. Условные вероятности. 5. Независимость событий. 6. Формула полной вероятности и формула Байеса. 7. Последовательные испытания и Схема Бернулли. 8. Случайные величины и функции распределения. 9. Биномиальная, пуассоновская, равномерно распределённая, экспоненциально распределённая и нормально распределённая случайные величины. 10. Теорема Муавра-Лапласа. 11. Числовые характеристики случайных величин. 12. Неравенство Чебышева. 13. Закон больших чисел. 14. Центральная предельная теорема. 15. Случайная выборка. 16. Эмпирическая функция распределения. 17. Оценка параметров распределения. 18. Выборочные моменты. 19. Линейная корреляция. 20. Проверка статистических гипотез. 	теоретический

Задание для показателя оценивания дескрипторов «Умеет», «Владеет»	Вид задания
<p>№ 1. Пусть S_n – число успехов в схеме Бернулли с испытаниями и вероятностью успеха $p = \frac{1}{3}$.</p> <p>а) Пусть $n = 1800$. Найти $P(575 < S_n < 635)$.</p> <p>б) Пусть $n = 1800$. При каком x $P(S_n \geq 635) \approx 0.6$?</p> <p>в) Пусть $n = 1800$. При каком y $P(S_n - 600 \leq y) \approx 0.75$?</p> <p>г) При каком n $P\left(\frac{S_n}{n} \geq 0.4\right) \approx 0.01$?</p>	практический

№ 2. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, где ξ_1, ξ_2, \dots – независимые случайные величины, причем $\xi_i \in U[b, 3b]$, $n = 400$ и $P(S_n \geq Z) \approx 0.15$.

а) Если $b = \frac{1}{2}$, то чему равно z ?

б) Если $z = 400$, то чему равно b ?

№ 3. Были проведены 100 независимых испытаний, по которым найдена относительная частота $\frac{m}{n} = 0.14$. Проверить нулевую гипотезу $H_0 = \{p = p_0 = 0.2\}$ при конкурирующей гипотезе $H_1 = \{p \neq 0.2\}$ при уровне значимости 0,05.

№ 4. Сырье, поступающее на завод из карьера, содержит два полезных компонента – минералы A и B . Результаты анализов пятнадцати образцов сырья, поступившего в разное время из разных мест карьера, приведены в таблице, где ξ_i и ζ_i – выборочные значения пары случайных величин ξ и ζ , выражающих соответственно процентное содержание минералов A и B в образцах. Найти коэффициент корреляции этих случайных величин.

ξ_i	67	54	72	64	39	22	58	43	46	34	60	50	45	55	53
ζ_i	24	15	23	19	16	11	20	16	17	13	20	15	12	22	23